

Pārbaudīts un zināms Jaunā iepakojumā

Satur K un Mg jonus.
Stiprina sirds muskuļa funkciju
un veicina kardiovaskulārās
sistēmas veselīgu darbību.



GEDEON RICHTER

Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas izlasiet instrukciju un konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu blakusparādību gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tālruni +371 67388780 (24 h). Reklāmas devējs – Gedeon Richter Plc. Pārstāvniecība Latvijā Reklāma izstrādāta 27.04.2016



SAĪSINĀTA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Kas ir Panangin apvalkotās tabletes un kādam nolūkam tās lieto:

Panangin apvalkotās tabletes ir minerālvielu līdzeklis, kas satur magniju un kāliju, kas ir svarīgi intracelulārie katjoni. Tiem ir nozīmīga loma vairāku enzīmu darbībā, saistot makromolekulas pie subcelulāriem elementiem, kas ir muskuļu kontrakcijas molekulārais mehānisms. Panangin apvalkotās tabletes var lietot magnija un kālija deficīta profilaksei nepietiekamas jonu uzņemšanas vai ievērojama elektrolītu zuduma (hroniska diurētisku vai caurejas līdzekļu lietošana, caureja vai citi iemesli) gadījumā.

Nelietojiet Panangin apvalkotās tabletes šādos gadījumos:

- akūta un hroniska nieru mazspēja;
- Adisona slimība (virsnieru garozas mazspēja);
- noteikti sirds vadīšanas traucējumi (3. pakāpes atrioventrikulāra blokāde);
- izteikti pazemināts asinsspiediens, ko izsauc sirds nespēja pārpumpēt pietiekošā daudzumā asinis (kardiogēns šoks);
- augsts kālija līmenis asinīs;
- ja Jūs lietojat kāliju aizturošu diurētisku līdzekli;

- ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret aktīvo vielu vai jebkuru no Panangin apvalkoto tablešu palīgvielām.

Kā lietot Panangin apvalkotās tabletes

Parastā deva ir 2 apvalkotās tabletes trīs reizes dienā, smagos gadījumos – 3 apvalkotās tabletes trīs reizes dienā vienu nedēļu. Pēc tam dienas devu var samazināt līdz vienai apvalkotajai tabletei divas vai trīs reizes dienā. Vieglas gadījumos jālieto viena apvalkotā tablete trīs reizes dienā. Kunga skābe var vājināt zāļu efektivitāti, tādēļ apvalkoto tableti ieteicams lietot pēc ēšanas.

Terapijas ilgumu nosaka deficīta stāvoklis atkarībā no indikācijām.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Panangin apvalkotās tabletes var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lielākas devas var izraisīt biežāku defekāciju. Ja Jūs novērojat neparastu diskomfortu, ziņojiet par to savam ārstam, cik ātri vien iespējams. Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI